

MISCELLANEA ENTOMOLOGICA

NUNTIUS ENTOMOLOGICUS INTERNATIONALIS

No. 6. Vol. VI.

ÉDITION FRANÇAISE

15 JUIN 1898.

NOTES DESCRIPTIVES SUR PLUSIEURS COLÉOPTÈRES ET SUR UN ICHNEUMON (*HYMÉNOPTÈRE*)

Microptinus brunneus. n. sp. — Subglobuleux-ovalaire, brun roussâtre brillant, orné de longs poils jaunâtres dressés. Antennes longues et claires. Prothorax assez court, sans lignes nettes de pubescence, orné de granulations arrondies, lisses en dessus, quelques-unes paraissant avoir une fossette médiane ; il est largement dilaté en avant, bien élargi devant la base et assez étroit sur sa partie postérieure. Ecusson très petit, pubescent de jaune. Élytres subglobuleux, assez bombés antérieurement, puis progressivement atténués en arrière, non sensiblement rétrécis vers le prothorax, à ponctuation forte, régulièrement disposée en lignes, cette ponctuation un peu embrouillée en avant ; 2 gros points près de l'écusson ; intervalles larges. Pattes claires, assez longues, bien pubescentes de jaune.

Long. 2 mill. environ. Tunisie : Teboursook (Dr Normand).

En battant des gourbis faits de branches sèches, en mars 98.

Très voisin de *nobilis* Reitt. par sa coloration et les caractères généraux ; mais plus élargi sur la partie antérieure du prothorax ; élytres différents, non nettement diminués vers le prothorax, la ponctuation disposée en lignes plus régulières.

Mariouta Letourneuxi Pic. — J'ai envoyé au Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun la description du genre *Mariouta* (groupe des *Dermestidae*), voisin par ses caractères du dessous du corps des *Dermestes* dont il diffère par la tête plus longue et la forme générale du dessus du corps bien différente, le prothorax étant en arrière plus étroit que les élytres.

Mariouta Letourneuxi est allongé, à peine brillant, noir ou brun avec les pattes et surtout les antennes roussâtres ; le prothorax est bien dilaté sur les côtés un peu avant le milieu, diminué en avant et surtout en arrière, sillonné longitudinalement sur le disque et marqué de chaque côté de 2 impressions plus ou moins profondes.

Long. 5 à 6 mill. D'Égypte et Algérie.

Halosimus (*Micromerus*) collaris F. var. **semiobscurus**. n. var. — Diffère de la forme type par la coloration obscurcie de la tête, du prothorax et des membres, ce qui fait que l'insecte est complètement noir ou rougeâtre très obscurci avec les élytres bleus ou verts.

Turquie d'Asie : Tokat (coll. Pic).

Edemera barbara F. v. **dalmatina**. n. var. — Verdâtre avec le prothorax plus ou moins taché de jaune, les antennes plus ou moins claires à la base, les pattes claires avec les cuisses à l'extrémité et partie des tarsi verdâtres ou noirâtres. Élytres ayant sur la suture une bande jaune plus ou moins distincte et élargie en avant ; extrémité des élytres tachée de pâle. ♂. ♀.

Long. 8-9 mill. Dalmatie (coll. Pic).

La bande claire longitudinale des élytres distinguera facilement la variété de la forme type; par sa tache claire apicale, cette modification ne m'a paru devoir être qu'une variété de *barbara* F.

Nemonyx lepturoides F. ? var. **semirufus** n. var. — Peu brillant, à pubescence grisâtre assez fine avec quelques poils courts redressés. Antennes (avec l'extrémité bien rembrunie), pattes, majeure partie antérieure des élytres d'un roux testacé; extrémité des élytres, tête et prothorax obscurcis. Rostre court, transversalement sillonné ou déprimé nettement en arrière, plus ou moins roussâtre en avant; yeux pâles. Antennes fortes, à 2^{me} article subglobuleux, les 3 et 4^{me} bien allongés, les trois derniers très élargis. Prothorax allongé. Élytres assez courts, un peu élargés après les épaules et bien atténués à l'extrémité, d'un roux testacé, plus ou moins obscurcis ou très rembrunis à l'extrémité, ayant des côtes très peu marquées et une ponctuation irrégulière peu forte. Dessous du corps plus ou moins foncé; pattes fortes d'un roux testacé.

Long. 4.5 à 5 mill. Kheroub (Hénon in coll. Pic).

Par sa coloration en majeure partie claire, *semirufus* se distinguera nettement et à première vue de *lepturoides* F. Le 2^{me} article des antennes semble un peu moins long et le dessous du corps moins hérissé de poils chez *semirufus* que chez *lepturoides*, caractères que je n'ose pas considérer comme nécessairement fixes et propres à représenter une espèce nouvelle, mais qui peuvent, au moins, aider à la distinction d'une variété nette d'espèce connue.

Mallosia costata Pic. — Cette belle espèce (1), venant du Kurdistan, par sa pubescence foncée se rapproche seulement de *mirabilis* Fald. ♀ avec une forme moins allongée, un aspect plus poilu, et de *tristis* Reitt. ♀ par la pubescence blanche des intervalles (entre les 5 côtes saillantes de chaque élytre) disposée en bandes; diffère nettement des deux par la présence des côtes élytrales nettes.

Long. 51 mill.

Lachnæa puncticollis Chev. var. **uniustigmata** n. var. — Modérément allongé, verdâtre brillant avec les élytres d'un roux flave, ornés d'une seule tache foncée sur le calus huméral, tandis que la forme type présente trois taches sur chaque élytre.

Tunisie : Teboursoûk.

Recueilli par le Dr Normand en un certain nombre d'exemplaires, dont 4 faisant partie de ma collection.

Evidemment, je n'aurais pas nommé cette modification sur un seul individu, mais ayant étudié plusieurs exemplaires semblables et venant de la même source, j'ai conclu à une variété et non à une modification accidentelle, d'autant plus qu'en dehors de ces exemplaires, je n'ai vu que des spécimens ayant 5 taches aux élytres et, de plus, Lefèvre, dans sa monographie, n'indique aucune oblitération de l'une ou l'autre des 5 taches de la forme type.

Ichneumon fabricator F. var. **kabylianus** n. var. — ♂ Entièrement foncé, avec très rarement une petite tache blanche en avant de la tête, près des yeux; pattes rouges avec les tarsi et l'extrémité des tibias postérieurs, parfois les tarsi des 4 membres antérieurs, noirs ou très rembrunis. Scape noir. Antennes noires, ordinairement roussâtres en dessous. Parties du métathorax à contours saillants, fortement plissés-ponctués; aréole supéro-médiane transversale. Postpétiole irrégulièrement et fortement ponctué-aciculé. ♀ noire avec les antennes courtes, annelées, les pattes en majeure partie rougeâtres, les postérieures ayant les cuisses rouges, les tarsi et tibias noirs, ces derniers marqués d'une tache blanche sur leur milieu en dessus; 4 pattes antérieures rouges, les tibias étant parfois, ainsi que les tarsi, un peu obscurcis en dessus sans présenter de tache blanche nette, au moins sur les antérieurs. Postpétiole fortement aciculé avec quelques points forts sur l'aire médiane.

Long. 9-12 mill. Algérie, d. ns les forêts de Kabylie : Yakouren, Akfadou (Pic!)

(1) Décrite dans le Bulletin de la Soc. d'Hist. Naturelle d'Autun, 1898

Le ♂ diffère du *fabricator* ♂, des régions tempérées, par la sculpture du métathorax plus accentuée, la ponctuation de l'avant-corps plus forte et espacée, la coloration entièrement foncée du scape; l'absence de trait blanc ou jaune aux orbites internes des yeux le distingue aussi des *fabricator* ordinaires : certains *fabricator* ont bien le scape en majeure partie foncé (nuance qui va généralement avec la variété ayant la tête foncée), mais il paraît toujours un peu brun en tout ou en partie. La ♀ diffère de *fabricator* ♀, avec les caractères du métathorax plus accentués, par la ponctuation de l'avant-corps plus forte et écartée, les pattes antérieures n'ayant pas de taches blanches sur les tibias. Il n'est pas impossible de considérer *Ichneumon kabylianus* comme une espèce propre, mais je crois plus juste de la présenter comme variété seulement de *fabricator* F.

M. PIC.

TABLEAUX ANALYTIQUES

POUR LA DÉTERMINATION

DES

COLÉOPTÈRES EUROPÉENS.

XXII

HETEROCERIDÆ

par A. KUWERT

Traduit des *Bestimmungs Tabellen der europäischen Coleopteren*.

(suite) *

-
40. Seulement avec demi arc femoral.
41. Avec jambes toutes noires, ou celles-ci sont uniformément brunes.
42. Élytres ayant dans le haut des lignes longitudinales très fines et régulières, $1\frac{3}{4}$ fois aussi longues que larges ensemble, avec dessins foncés rouge brun, linéament et densément ponctués, la pubescence courte a un reflet un peu jaunâtre. Corselet avec angles antérieurs rouges, ayant aux côtés une couronne de poils avec reflets blancs, qui diminue en longueur au bord des élytres. Partie postérieure du corps largement bordée de rouge. Corselet fortement rétréci en avant, aplati aux deux côtés avant le bord postérieur. Tout le prosternum, ainsi que les palpes et les antennes sont noirs. Abdomen avec pubescence blanchâtre et garnie en outre de quelques longs poils blancs.
Long. 5 mm. — Sicile.
38. *siculus* Kw.
42. Élytres sans lignes longitudinales semblables fines et régulières.
43. Jambes noires, avec pieds rouges. Insecte long de 4-5.5 mm., assez large, noir, avec dessins rouges. Dessus grossièrement et assez peu densément ponctué, avec poils noirs dressés, de longueur assez inégale et le plus souvent des dessins proportionnellement petits sur le dessus, rouges ainsi que le bord latéral. Souvent tous les dessins sont couverts par du poil à reflets brunâtres, manquant plus rarement. Seg-

(*) Voir n° 11-12 1896. 4, 5, 1898